

# Kohorsz vizsgálát

Kohorsz vizsgálát

Analitikus epidemiológiai vizsgálát.

A kohorszvizsgálát a tanulmányozandó megbetegedés – az okozat – bekövetkezése előtt indítja a betegség kialakulása és a feltételezett kockázati tényező összefüggésének vizsgálátát, úgy, hogy a vizsgált betegségtől mentes egyének exponált és nem exponált csoportjaiból (kohorszaiból) indul ki, és vizsgálja a betegség fellépését (a megbetegedést) az exponált és a nem exponált csoportokba tartozó egyének mindegyikénél.

Például: Klasszikus tanulmány ebben a vizsgálattípusban a Framingham Study (1949-től – gyakorlatilag napjainkig), melynek indításakor egy földrajzilag és demográfiaailag jól meghatározott populációban az ischaemiás szívbetegségek kialakulásának vizsgálátát tűzték ki célul, de a hosszú távú követés során egyéb (légzőrendszeri, mozgásszervi, szemészeti stb.) betegségek és a feltételezett kockázati tényezők összefüggésének elemzésére is kiterjesztették.

Forrás:

[https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011\\_0001\\_524\\_Megelozo\\_orvostan\\_nepegeszsegtan/ch04s05.html](https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Megelozo_orvostan_nepegeszsegtan/ch04s05.html)

Kohorsz vizsgálát jellemzői

- Az expozíció már a betegség kialakulása előtt vizsgálható
- Egy expozícióra több végpont vizsgálható
- Prospektív vizsgálát, de lehet „historikus” is
- A vizsgálátból incidencia mérhető
- Az incidenciákból relatív és járulékos kockázatszámítható
- Fokozottan idő- és költségigényes vizsgálát

- Kohorszok követése nehéz, az együttműködés változó, gyakori a lemorzsolódás a vizsgálatból



Forrás:

[https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2016/09/1617\\_I\\_A0Ky03\\_epidemiologiai\\_vizsgalatok.pdf](https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2016/09/1617_I_A0Ky03_epidemiologiai_vizsgalatok.pdf)